

## Les principales IST

IST	Organisme en cause	Principaux symptômes	Où aller me faire dépister ? Qui aller voir ?	Délectable quand ?	Traitement	Vaccin
<b>Chlamydioses / Chlamydias</b>	Bactéries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très souvent asymptomatiques</li> <li>• Pertes vaginales</li> <li>• Brûlures en urinant</li> <li>• Douleurs lors des rapports</li> <li>• Saignements et spotting</li> <li>• Douleurs dans le bas-ventre</li> <li>• Douleurs rectales et écoulements anaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin</li> <li>• Sage-femme</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD*</li> <li>• Les CPEF**</li> <li>• Centre de PMI***</li> <li>• Les PASS****</li> </ul>	3 à 30 jours après la transmission de la bactérie	Antibiotiques adaptés	Non
<b>Blennorragie gonococcique / Gonorrhée</b>	Bactéries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fxmmes très souvent asymptomatiques</li> <li>• Brûlures en urinant</li> <li>• Écoulements purulents par l'urètre</li> <li>• Gonflement au niveau des testicules ou du rectum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin</li> <li>• Sage-femme</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Analyse d'urine ou prélèvement fait en passant un coton-tige sur les organes touchés (vagin, rectum, parois buccales...)	Antibiotiques adaptés	Oui
<b>Trichomonase</b>	Parasite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertes vaginales</li> <li>• Démangeaisons</li> <li>• Brûlures en urinant</li> </ul> <p>&gt; La majorité des personnes avec un pénis est asymptomatique</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Prélèvement urinaire ou urétral à faire 4 semaines après le rapport à risque	Antibiotiques	Non
<b>VIH</b>	Virus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragilisation progressive de tout le système immunitaire</li> <li>• Symptômes "invisibles" pendant des années</li> <li>• Sans traitements, le nombre de cellules du système immunitaire diminue et des maladies "opportunistes" attaquent l'organisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> <li>• Associations de lutte contre le Sida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement sanguin à partir de la 6e semaine après le rapport à risque</li> <li>• TROD (test Rapide d'Orientation Diagnostique) et auto-test à partir du 3e mois après le rapport à risque</li> </ul>	<p>Le TPE<sup>1</sup> est un traitement d'urgence → Durée d'un mois → Commencer au plus tard dans les 48 h après le rapport à risque</p> <p>La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) est une stratégie de prévention qui consiste à prendre un médicament antirétroviral → Pour les personnes non-infectées mais qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif et sont à haut risque de contracter le VIH</p>	Non
<b>Syphilis</b>	Bactérie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparition d'un - ou plusieurs - bouton(s) rouge(s) sur les organes génitaux, l'anus ou le fond de la gorge</li> <li>• Ce(s) bouton(s) évolue(nt) en ulcère non-douloureux qui peu(ven)t persister durant 1 à 2 mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Prélèvement sanguin 4 à 6 semaines après le rapport à risque	<p>Antibiotique</p> <p>→ La durée du traitement varie en fonction du stade syphilitique</p>	Non
<b>HPV (Human Papilloma Virus)</b>	Virus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majoritairement asymptomatique</li> <li>• Peut provoquer des lésions bénignes sur la peau de la vulve, du périnée, de l'anus, du canal anal, du vagin ou du col</li> </ul> <p>→ Dans 10% des cas, ces lésions deviennent précancéreuses. Elles disparaissent naturellement ou évoluent sous forme d'un cancer après quelques années.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin</li> <li>• Sage-femme</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Frottis et test HPV	<p>Pas de traitement spécifique.</p> <p>→ Certains traitements peuvent être prescrits en fonction des maladies développées (cancer...)</p>	Oui
<b>Herpès génital</b>	Virus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Démangeaisons, boutons, cloques</li> <li>• Nausées, maux de tête, grande fatigue, sensation d'ébriété</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin</li> <li>• Sage-femme</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Examen des signes cliniques	<p>Antiviraux</p> <p>→ Durée du traitement variable en fonction du stade de l'infection</p>	Non
<b>Hépatite B</b>	Virus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte d'appétit, douleurs articulaires, urine foncée, jaunissement de la peau et des yeux</li> <li>• Plus rarement : fièvre, nausées ou douleurs à l'estomac</li> </ul> <p>→ Risque de devenir chroniques et d'entraîner de graves complications comme une cirrhose ou un cancer du foie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratoire public ou privé</li> <li>• Les CeGIDD</li> <li>• Les CPEF</li> <li>• Centre de PMI</li> <li>• Les PASS</li> </ul>	Prise de sang à faire 4 à 8 semaines après un rapport à risque	<p>Pas de traitement spécifique.</p> <p>→ Repos → Alimentation pauvre en gras → Pas d'alcool ni de médicaments</p>	Oui

\*CeGIDD : Centres gratuits d'information, de Dépistage et de Diagnostic

\*\*CPEF : Centres de Planification et d'Education Familiale

\*\*\*PMI : Protection Maternelle et Infantile

\*\*\*\*PASS : Permanence d'Accès aux Soins de Santé pour personnes en situation de précarité

<sup>1</sup>Traitement Post-Exposition - Dossier : TOUT SAVOIR SUR LE TPE, 3 mars 2021, mise à jour le : 5 avril 2022, <https://www.sida-info-service.org/dossier-tpe-pep/>